

METANFETAMINA

- Es un **estimulante** sumamente adictivo que afecta el sistema nervioso central.
- Un estimulante es un tipo de droga (o de fármaco) que activa ya acelera el cerebro.
- La metanfetamina de cristal es una forma de droga con **aspecto de fragmentos de vidrio o piedras blancoazuladas brillantes**.
- Su **estructura química es similar a la de la anfetamina**, un fármaco que se usa para tratar el TDAH y la narcolepsia, un trastorno del sueño.

METANFETAMINA

- Nombres comunes: **azul, cristal, hielo, met y anfeta** (*blue, cristal, ice, meth y speed*, en inglés).
- La metanfetamina se puede: **fumar, ingerir** (píldoras), **aspirar** o **inyectar**.
- Las metanfetaminas, al igual que las anfetaminas, también quitan el apetito, de modo que algunas personas utilizan esta peligrosa estrategia para perder peso en poco tiempo.

METANFETAMINA

Efectos a corto plazo

- Aumento de la vigilia y la actividad física.
 - Disminución del apetito.
 - Respiración rápida.
 - Ritmo cardíaco o irregular.
 - Presión arterial y temperatura corporal elevadas.
-
- Las personas que se inyectan metanfetamina tienen mayor riesgo de contraer enfermedades infecciosas como VIH y hepatitis B o C.
 - Pueden alterar el juicio y la toma de decisiones, lo que genera conductas de riesgo como la actividad sexual sin protección.

METANFETAMINA

Efectos a largo plazo

- Pérdida excesiva de peso.
- Adicción.problemas dentales graves (“boca de metanfetamina”).
- Comenzón intensa que lleva a lesiones en la piel producidas al rascarse.
- Ansiedad.
- Cambios estructurales y el funcionamiento del cerebro.
- Confusión.
- Pérdida de la memoria.
- Problemas para dormir.
- Comportamiento violento.
- Paranoia
- Alucinaciones.

METANFETAMINA

Adicción

- La metanfetamina es altamente adictiva.
- Cuando una persona deja de consumirla, los síntomas de abstinencia pueden incluir: ansiedad, fatiga, depresión y psicosis.

Sobredosis

- Es posible sufrir sobredosis por metanfetamina.
- Una sobredosis ocurre cuando una persona consume gran cantidad de una droga y sufre una reacción tóxica que causa síntomas nocivos graves o muerte.

Informe Mundial sobre Drogas 2020

- En 2018, **27 millones** de personas en el mundo, utilizaron **estimulantes de tipo anfetamínico**, de los cuales la **metanfetamina** fue la más común.
- El uso de metanfetaminas parece estar aumentando en norteamérica.
- El mundo de los estimulantes está dominado por la cocaína y la metanfetamina, y el consumo de ambas sustancias está aumentando en sus principales mercados.
- La metanfetamina que se incauta en EEUU en los últimos años, es cada vez con más frecuencia, metanfetamina importada, y el comercio de esta sustancia está controlado por los cárteles mexicanos.

Fuente: UNODC. Informe Mundial sobre Drogas, 2020.

METANFETAMINA

Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, 2017

Población de 12 a 65 años

	Total %	Hombres %	Mujeres %
Alguna vez en la vida	0.9	1.4	0.4
Ultimo año	0.2	0.4	0.1

45.8% de las personas que han consumido estimulantes tipo anfetamínico alguna vez en la vida lo hicieron entre los 18 y 25 años de edad.

Fuente: ENCODAT 2016-2017. Reporte de drogas, 2017.

METANFETAMINA

Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, 2017

Población de 12 a 17 años

	Total %	Hombres %	Mujeres %
Alguna vez en la vida	0.6	0.4	0.8
Último año	0.2	0.2	0.3

*La encuesta reporta los datos para estimulantes tipo anfetamínico.

Fuente: ENCODAT 2016-2017. Reporte de drogas, 2017.

METANFETAMINA

Encuesta Nacional del Consumo de Drogas en Estudiantes, 2015

Estudiantes de secundaria y bachillerato

	Secundaria	Bachillerato	Secundaria y bachillerato		
	Total	Total	Hombres	Mujeres	Total
Alguna vez en la vida	1.3	3.1	2.3	1.7	2.0
Último año	0.9	2.0	1.5	1.1	1.3
Último mes	0.5	1.0	0.9	0.6	0.7

Fuente: ENCODE 2014. Reporte de drogas, 2015.